

INSTRUCCIONES DESPUES DE EL ABORTO

Tenga en cuenta que su prueba de embarazo puede ser positiva hasta 6 semanas después de cualquier embarazo (terminación, aborto espontáneo or parto).

MEDICAMENTOS

- Si le han dado medicamentos IV (intravenoso) para aliviar la ansiedad y el dolor hoy, fuertemente le recomendamos que no conduzca ni tome decisiones importantes durante el resto del día.
- Si piensa que tiene fiebre, COMPRUEBE SU TEMPERATURA CON UN TERMOMETRO. Si es mas de 100.4°, háblenos enseguida.
- Puede tomar Advil o Motrin (ibuprofeno) si esta teniendo cólicos. Tome 3 pastillas (200 mg cada una) una vez cada 6 horas. En cambio de, puede usar Aleve (naproxen) u Orudis (ketoprofen) de acuerdo con las intrusiones en el paquete.

CONTROL DE NATALIDAD

- Si va usar píldoras anticonceptivas, puede comenzar a tomarlos el primer Domingo después del aborto. Serán efectivos para el momento en que reanude relaciones sexuales (en 2 semanas) si toma una cada día según las instrucciones. "La inyección" (Depo) está disponible cada tres meses. Puede recibirlo el día de su procedimiento o en su examen de seguimiento.

CITA DE SEGUIMIENTO

- Por lo general, no es necesario un examen de seguimiento si se siente bien y no tiene preocupaciones. Si desea un examen de seguimiento, puede tener uno sin costo adicional de 2 a 4 semanas después del aborto.

SANGRADO/REGLA MESNTRUALES

- El sangrado vaginal generalmente desaparece y se detiene en 2 semanas, pero no es necesariamente anormal tener un poco de sangrado durante hasta 8 semanas. Sin embargo, debe llamarnos o consultar a un médico si debe cambiar las toallas con más frecuencia de 2 por hora.
- En algunos casos, hay poco o ningún sangrado después de un aborto; Esto no es necesariamente anormal. Desecho café también puede aparecer de vez en cuando mientras su cuerpo se está recuperando. PASAR COAGULOS DE SANGRE. PUEDEN SER COMPLETAMENTE NORMAL.
- Debe tener su próximo período menstrual dentro de las 4-8 semanas posteriores al aborto.

OTRA INFORMACION

1. Si recibió medicación intravenosa para el dolor y la ansiedad, no debe conducir ni tomar decisiones importantes durante el resto del día.
2. Náuseas y vómito pueden ser normales. Si no puede mantener nada por más de 8 horas, llámenos.
3. Es normal sentirse emocional después. Esto es totalmente saludable.
4. Sus recetas debe llevarla a la farmacia para surtirla. Comprará el medicamento en la farmacia. Puede usar un seguro de salud para obtener estos medicamentos.
5. Puede usar una almohadilla térmica a veces. No son caros y funcionan tan bien como una pastilla para el dolor.

Si tiene problems o preguntas urgentes después de horario, llámenos al (702)892-0660. **SERIAMENTE** recomendamos que nos hable antes de ir al Cuarto de Emergencia (Emergency Room). Usualmente podemos tratarla en nuestra oficina en menos tiempo y sin ningún costo a usted.